

## SUMMARY

The compound "Dichim – 1" is low-toxic in the doses exceeding the therapeutic one (s) in 4-10 times.

Keywords: Veterinarian drugs, insecticides, acaricides, toxicity.

## Литература

1. Зубенко А.А., Фетисов Л.Н., Зубенко И.В. Новое инсектицидное вещество из производных имидазола./Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями.- М-лы науч. конф.-М., ВИ-ГИС.-2009 с.191-193
2. Материалы Первой Международной конференции «Химия и биологическая активность гетероциклов и алкалоидов».-Т.2., М. – 2001
3. Материалы Международной конференции «Синтез и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов».- М. – 2006
4. Фетисов Л.Н., Зубенко А.А., Должников М.А. Вестник ветеринарии. 32, №1, 2005, с. 35-38
5. Зубенко А.А., Фетисов Л.Н., Зубенко И.В. Вестник ветеринарии. 43, №4, 2007, с. 19-21

Контактная информация об авторах для переписки

**А.А. Зубенко, Л.Н. Фетисов, Н.В. Стрельцов, А.Н. Бодряков**  
346421, г.Новочеркасск, Ростовское шоссе, СКЗНИВИ. [www.skznivi.ru](http://www.skznivi.ru)

УДК 619:616.983.636

**Карташов С.Н., Ключников А.Г., Грибов К.П.**

(ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии)

## ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ, ВЫЗВАННЫХ НАЕМОPHILUS SOMNUS

Ключевые слова: эндометрит, гемофилез, *Haemophilus somnus*.

Актуальность. Диагностика и терапия послеродовых эндометритов у крупного рогатого скота остается нерешенным вопросом вот уже в течение многих лет. Экономические потери от данного заболевания связаны со снижением удоев, затрат на лечение, уничтожением молока contaminated лечебными препаратами, затрат на работу специалистов, и возможной гибели животного. Применение химиотерапевтических средств для лечения эндометритов сопряжено с целым рядом негативных сторон, и в частности, с недостаточной лечебной эффективностью, снижением качества и количества животноводческой продукции, ингибирующим влиянием на факторы локальной и общей резистентности макроорганизма, отрицательным влиянием на морфофункциональное состояние эндометрия. Вместе с тем в литературе имеются данные, что до 30% послеродовых эндометритов у коров вызываются специфическими возбудителями, существенную долю которых составля-

ют эндометриты вызванные *Haemophilus somnus*.

В этой связи имеется объективная необходимость в усовершенствовании методов диагностики послеродовых эндометритов у коров.

Цель и задачи исследования. Цель настоящих исследований выснить эпизоотологические аспекты эндометритов у крупного рогатого скота вызванных *Haemophilus somnus*, разработать экспресс методы диагностики данной патологии.

Материалы и методы. Работу выполняли с 2007 по 2010 гг. в лаборатории функциональной диагностики болезней сельскохозяйственных животных ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии и Ростовской областной ветеринарной лаборатории. Работа выполнялась на базе 3 хозяйств 4 районов Ростовской области по государственной тематике РАСХН.

Для изучения эпизоотической ситуации по гемофилезу были проанализированы результаты лабораторных исследований

ГУРО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» и лаборатории функциональной диагностики болезней сельскохозяйственных животных ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии. Для микробиологических исследований маточные выделения получали методом ректального массажа матки и вагинального отбора в одноразовые пробирки. С целью определения состава микрофлоры матки осуществляли посев полученного материала на МПА, МПБ, кровяной агар, МПА с 1% глюкозы, и др. Идентификацию изолированных микроорганизмов проводили с учетом их морфологических, культуральных свойств по общепринятым методикам. Для определения вида бактерий использовали пластины биохимические дифференцирующие энтеробактерии и стафилококки, углеводные среды Гиса. Диагностику гемофилеза проводили в лаборатории ГНУ СКЗНИВИ РАСХН и ГУРО «Областная ветеринарная лаборатория», с помощью тест-систем для выявления ДНК микроорганизмов биологическом материале методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле. Cat.№ VET-1-R 0,5.

Результаты исследований.

Исследования на гемофилез проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в агарозном геле. В основе метода лежит амплификация специфического участка за счет многократного повторения циклов денатурации ДНК в исследуемой пробе, отжига специфических олигонуклеотидных затравок (праймеров) и синтеза цепей ДНК с помощью фермента Taq-полимеразы.

Выделение нуклеиновых кислот проводили с использованием коммерческого набора производства ЦНИИЭ Роспотребнадзора в соответствии с рекомендациями изготовителя. Метод выделения основан на специфической обратимой сорбции ДНК в присутствии хаотропных солей (гуанидин-тиоцианат, гуанидинхлорид, NaI, и т.д.) на частицы силикагеля.

Нуклеотидные последовательности генов-мишеней для ПЦР были получены из баз данных NCBI GenBank. Анализ нуклеотидных полноразмерных геномов и участков различных генов бабезий, взятых из базы данных GenBank (NCBI) последовательностей, проводили с применением пакета прикладных программ «BioEdit 6.0».

В результате выравнивания нуклеотидных последовательностей 16S рРНК-гена 10 штаммов *H. somnus* было выяв-

лено несколько протяженных районов 100%-ной идентичности нуклеотидной последовательности между всеми штаммами, которые и были избраны в качестве мишеней для отжига праймеров и проб. Дизайн праймеров, комплементарных данному участку осуществлялся таким образом, чтобы 3'-терминальные и/или субтерминальные нуклеотидные остатки были комплементарны родоспецифичным остаткам в последовательностях 16S-рРНК и содержали гуанин или цитозин.

Рассчитанные видоспецифичные праймеры для выявления кДНК имели высокую температуру отжига 68°C, это позволило объединить два этапа реакции (отжиг и элонгацию), в один. В результате удалось значительно снизить время постановки реакции, что не повлияло на её специфичность и чувствительность. Постановку ПЦР проводили в реакционной смеси стандартного состава с использованием 10 пкМ каждого праймера, 5 мкл раствора кДНК с добавлением 3 mM MgCl<sub>2</sub>. Амплификация проводилась на программируемом термостате «Терцик» (ЗАО «ДНК-технология», Москва) в следующем режиме: предварительная денатурация при 95°C в течение 5 минут, затем 35 циклов, включающих этапы 1) денатурация при 95 °C – 10 секунд, отжиг праймеров при 68 °C – 10 секунд, 3) элонгация при 72 °C – 10 секунд.

В качестве положительного контроля использовали ДНК выделенной бактериологическими методами культуры.

Детекция продуктов амплификации проводилась электрофорезом в 2% агарозном геле в растворе бромистого этидия.

Диагностические характеристики разработанной тест-системы изучали в сравнении с классическим бактериологическим методом, подразумевающим выделение чистых культур бактерий из исследуемого материала с использованием электролитных питательных среды и последующую морфологическую и биохимическую (либо серологическую) идентификацию выделенных культур. Всего было исследовано 117 клинических образцов (патологический материал, истечения и мазки из носовых ходов), среди которых 22 клинических образца представляли собой материал, полученный от новорожденных коров, находящихся в родильном отделении.

При изучении клинических образцов метод ПЦР проявил большую чувствительность по сравнению с классическим бактериологическим методом. Так, методом ПЦР *H. somnus* был выявлен в 31 об-




Рис. Выравнивание нуклеотидных последовательностей FtsJ гена нескольких штаммов *H. somni*

разце (26,5%), в то время как с использованием бактериологического метода бактериальную обсемененность выявляли в 29 образцах (24,8%).

Возможно, это связано с назначением антибактериальной терапии клинически больным коровам. Поэтому в образцах, полученных от этих животных, присутствовали либо погибшие *H. somni*, либо их некультивируемые формы, ДНК которых и определялась методом ПЦР в 1,71% случаев. В этой связи показатели чувствительности и специфичности ПЦР для детекции *H. somni* по сравнению с бактериологическим методом составили 100% и 93,55% соответственно.

В структуре акушерско-гинекологических патологий в изучаемых нами хозяйствах на первом месте стоит острый послеродовый эндометрит (54,3 %) от всех случаев оказания акушерско-гинекологической помощи. За ним следуют такие заболевания, как задержание последа, процент которого очень высок, почти у всех коров с задержкой последа в дальнейшем развивался послеродовый эндометрит. Субинволюция матки отмечалась в 7%, персистенция желтого тела в 7% случаев, гипофункция яичников в 1 % случаев.

Для послеродовых эндометритов характерна сезонность. Наибольшее количество отелов в изученных хозяйствах происходит в период с ноября по февраль, а послеродовыми эндометритами животные чаще заболевают с января по март месяц, в это время переболевает от 76 до 80% отелившихся животных.

Большое значение для развития эндометрита имеет возраст животного. Наиболее подвержены данной патологии коровы первотелки, среди них переболевает 64,3%, и коровы в возрасте старше 5 лет, среди них переболевает 69,1 %. По данным наших исследований заболеваемость отелившихся коров острым послеродовым эндометритом в исследованных хозяйствах в среднем составляла 54,3% коров. Кроме того нами установлено, что заболева-

емость коров послеродовым эндометритом гемофильной этиологии составляет 43% от общего числа коров заболевших острым послеродовым эндометритом. Наибольшее количество животных заболевает послеродовыми эндометритами в зимне-весенний период, что составляет 62,3 % от общего количества отелившихся коров, а в летне-осенний период-33,7%.

Нами были проведены исследования по изолированию возбудителей послеродового эндометрита из течковых выделений коров и маточных выделений в послеродовый период от тех коров, которые заболели послеродовым эндометритом. При микробиологическом исследовании маточного содержимого от 458 коров 4 хозяйств, больных острым гнойно-катаральным послеродовым эндометритом, из течковой слизи от тех же коров выделено 18 видов микроорганизмов.

Чаще всего встречались следующие патогенны в исследуемом материале: *Escherichia coli*, *Arcanobacter pyogenes*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides* spp., *Staphylococcus* spp., *Haemophilus somni*, *Manheimia hemolytica*, *Pasteurella* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium* spp., *Streptococcus* spp., *Chlamydomphila* spp., *Ureaplasma* spp., *Salmonella* spp., *Mycoplasma* spp., *Neisseria* spp., вирус вирусной диареи КРС (BVD), вирус инфекционного ринотрахеита КРС (BHV-1) (табл. 2).

Выводы. Таким образом, микробный фон матки представлен разнообразными видами условно-патогенных микроорганизмов, которые являются одной из непосредственных причин острого воспаления матки животных, несмотря на то, что *H. somni* редко выделяется из течковой слизи коров, при остром послеродовом эндометрите он выделялся у 223 коров из 458, что составило 48,7%, у 97 коров, *H. somni* выделялся как единственный инфекционный агент острого послеродового эндометрита.

**Резюме:** Изучено распространение эндометритов у коров, вызванных преимущественно *Haemophilus somnus*. Установлено, что *H. somnus* выделялся у 48,7% коров с эндометритом. ПЦР анализ патологического материала проявил большую чувствительность по сравнению с классическим бактериологическим методом.

#### SUMMARY

The microbic background of a uterus is presented by various kinds of conditional-pathogenic microorganisms which are one of immediate causes of a sharp inflammation of a uterus of animals in spite of the fact that *H. somnus* it is seldom allocated from oestrus slime of cows, at sharp postnatal endometritis it was allocated at 223 cows from 458, that has made 48,7 %. At 97 cows, *H. somnus* the agent sharp postnatal endometritis was allocated as unique infectious.

Keywords: endometritis at cows, hemophilosis, *Haemophilus somnus*.

#### Литература

1. Garcia-Delgado, G. A., P. B. Little, and D. A. Barnum. A comparison of various *Haemophilus somnus* strains. *Can. J. Corp. Med.* 2001, p. 380-388.
2. Gogolewski, R. P., S. A. Kania, T. J. Inzana, P. R. Widders, H. D. Liggitt, and L. B. Corbeil. Protective ability and specificity of convalescent serum from calves with *Haemophilus somnus* pneumonia. *Infect. Immun.* 2007 p. 1403-1411.
3. Humphrey, J. D. *Haemophilus somnus*: colonization of the bovine reproductive tract, strain variation and pathogenicity. Ph.D. thesis. University of

Контактная информация об авторах для переписки

**Карташов С.Н., Ключников А.Г., Грибов К.П.**

346421, г.Новочеркасск, Ростовское шоссе, СКЗНИВИ. [www.skznivi.ru](http://www.skznivi.ru)

УДК 619:618:636.7

**Карташова Е.В., Ермакова И.А., Лобус С.В., Карташов С.Н.**

(ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии)

## **НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ, ВЫЗВАННЫЙ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS - ПРИЧИНА СЕПСИСА У СОБАК**

Ключевые слова: Сепсис, *Clostridium perfringens*, клостридиоз, некроз беременной матки у собак, эндотоксикоз.

Термины «сепсис», «септические заболевания» широко известны со времен Гипократа. Важнейшая роль в становлении современных представлений о сепсисе принадлежит И.В. Давыдовскому [1]. Летальность при септическом шоке достигает 8%. Как причина материнской смертности септические осложнения занимают 2—4-е место. Летальность, связанная с сепсисом, за последние 50 лет снизилась лишь на 20% и к началу XXI в. составляет около 40%, что ставит сепсис на 13-е место среди причин смерти населения. Ежедневно в Западной Европе от сепсиса погибает более 1400 человек [2]. Акушерский сепсис чаще всего возникает вследствие попадания инфекции в матку в процессе родов или в послеродовом периоде [1, 2, 3]. У сук, по всей видимости, контаминация влагалища и матки

*C. perfringens* в период родов протекающих с дистоциями приводит к развитию тяжелого некротического эндометрита с последующим развитием сепсиса. Для развития этого состояния необходимо наличие, по крайней мере, двух факторов, контаминации матки *C. perfringens*, попадающих в полость матки с содержимым кишечника и дистоций, затрудняющих разрешение родового процесса. Данное патологическое состояние являются редкими и слабо описаны в литературе. Вместе с тем, развивается оно стремительно, иногда в течение нескольких часов с фатальными для животного последствиями, что и послужило основанием для нашего исследования.

Актуальность темы. В стадии септикопиемии удаление матки не всегда дает выраженный эффект, так как возникшие вто-